

农作物病虫测报

第七期

鹤山市农业农村局

2026 年 9 月 28 日发布

做好晚稻破口前病虫害防治工作 保穗稳产

据鹤山市农业技术推广中心 9 月 20-24 日到全市水稻种植区域进行调查，我市晚稻处于幼穗分化期，早插田块即将破口抽穗。当前主要病虫害为稻飞虱、稻纵卷叶螟和钻蛀性螟虫，部分田块见稻粉虱为害。现阶段气候条件与田间郁闭环境，利于“两迁害虫”迁入繁殖，同时易诱发纹枯病、稻瘟病、稻曲病等病害。综合各监测点数据、田间调查情况、病虫害发生规律和气候特点等因素进行分析，预计晚稻后期病虫害发生程度为中等发生。

一、稻飞虱 属中等发生。田间虫态以成虫、卵为主，一般田块百丛虫量约 300 头，高的达 1000 头，田间见褐飞虱长翅型成虫。自 9 月 15 日起，各监测点灯下陆续出现成虫诱捕高峰。当前江南、长江中下游等稻区稻飞虱暴发为害，预计 10 月上中旬回迁我省，预测我市晚稻中后期偏重发生。当百丛若虫量达到 1000 头时，及时开展药剂防治。

二、稻纵卷叶螟 属轻发生。据田间调查，9 月 22 日在桃源镇蟠光村可见 4 龄幼虫及成虫，其余地区多以成虫为主。当前晚稻虫态呈世代重叠，各农户应结合自身田块虫情针对性开展防

治。建议选用可兼治大龄幼虫与杀卵的药剂。建议防治适期 9 月 28-30 日。

三、钻蛀性螟虫 中等发生，主要为二化螟和大螟，在早插田块可见钻心为害，发生程度高田块枯心率达 2%。监测点在 9 月 19 日和 21 日诱捕蛾峰，前期已受钻蛀性螟虫为害的田块，建议防治适期 9 月 28-30 日。

四、稻瘟病 轻发生。如遇适温高湿天气容易诱发稻瘟病。在破口前用药，可有效预防穗颈瘟。

五、纹枯病 轻发生。在址山镇和桃源镇早插田块偶见发生。随着田间郁闭湿度高，稻飞虱数量增加，在吸食稻株后排出的“蜜露”极易加速纹枯病发生。建议在破口前开展防治，压低病原基数，尤其密植田块，需要重点防控。

六、稻粉虱 中等偏轻发生。在址山镇昆中村委会田块可见稻粉虱成虫、若虫。稻粉虱为害严重时，植株长势衰弱，叶片枯黄，造成稻穗短小，千粒重下降。建议破口前开展防治。

七、细菌性病害 目前未见发病。参考去年晚造细菌性病害发生普遍，后期防治压力大，建议历史病区和种植易感品种的在破口前适当防治，减轻大发生后防治压力。

八、防治意见

我市晚稻种植期不一致，田间水稻生育进度差异较大，各镇种植户应根据自身田块实际情况做好病虫害防治工作，本次测报建议水稻破口前 3-7 天开始病虫害防治，防治稻飞虱和病害为主，

挑治稻纵卷叶螟和钻蛀性螟虫，做到“早破口，早施药；迟破口，迟施药”，保穗稳产。如有疑问，请咨询属地农技部门。

建议农户根据自身实际情况选择合适药剂，每种病虫害只选一种药剂，选用持效期长、粘着性和展着性好的药剂，适时喷施。

防治对象和选用药剂推荐亩用量如下：

病虫害类型	推荐药剂（选择一种）
钻蛀性螟虫	阿维菌素、四氯虫酰胺、甲维·茚虫威（确保药剂喷施到稻株基部（稻头位置））
稻飞虱	三氟苯嘧啶、呋虫胺、烯啶虫胺
稻纵卷叶螟	茚虫威、乙基多杀菌素、多杀霉素、虱螨脲（杀卵）
纹枯病	井冈霉素、肟菌·戊唑醇、苯甲·丙环唑、噻呋酰胺
稻瘟病	吡唑醚菌酯、肟菌·戊唑醇、三环唑、稻瘟灵
白叶枯、细菌性条斑病	噻菌铜、噻霉酮、噻森铜、春雷霉素
稻曲病	戊唑醇、苯甲·丙环唑
稻粉虱	二嗪磷或毒死蜱+噻虫嗪
跗线螨	螨危、哒螨灵

注意农药的轮换与交替使用，遵守安全间隔期。施药时田间保持浅水层 3-5 厘米，并保水 3-5 天，确保药效。喷药后 4 小时内遇中雨以上要及时补喷。如遇技术问题，请咨询属地农技部门。

注意保护环境，请自觉做好农药包装废弃物回收处理。